

**ПРИМЕР ТЕСТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА**

Поштовани,

Пред вама се налазе задаци различитог нивоа сложености из области здравствене неге. Пажљиво прочитајте свако питање и заокружите један тачан одговор.

1. Положај болесника у постељи може бити:

- а. Активан и пасиван
- б. Принудан
- ц. Ниједан одговор није тачан
- д. Тачни су одговори под 1. и 2.

2. Које су методе контроле стерилизације:

- а. Физичка
- б. Хемијска
- ц. Микробиолошка
- д. Сви понуђени одговори су тачни

3. Глазговска скала врши процену:

- а. Психичког статуса пацијента
- б. Соматског стања пацијента
- ц. Стања свести
- д. Сви одговори су тачни

4. Материјал припремљен по методама антисепсе је:

- а. Стерилан
- б. Дезинфикован
- ц. Оба одговора су тачна

5. У механизме настанка декубитуса не спада:

- а. Притисак
- б. Смицање
- ц. Ударац
- д. Трење

6. Палијативна нега представља:

- a. Негу болесника у терминалној фази болести
- б. Негу болесника након оперативног третмана малигног обољења
- ц. Негу болесника који се спремају за оперативни третман малигног обољења
- д. Ниједан одговор није тачан

7. Заокружите тачан одговор:

- a. Примена антибиотика не представља меру превенције од инфекција
- б. Примена антибиотика условно представља меру превенције од инфекција
- ц. Примена антибиотика представља једну од основних мера превенције од инфекција
- д. Ниједан одговор није тачан

8. Брадикардија је:

- a. Нормална фреквенција дисања
- б. Убрзана фреквенција срчаног рада
- ц. Нормална фреквенција срчаног рада
- д. Успорена фреквенција срчаног рада

9. Појам „асептичан“ је апсолутни појам

- a. Одговор је тачан
- б. Одговор је нетачан
- ц. Одговор је условно тачан
- д. Одговор је условно нетачан

10. Која је рутинска и најједноставнија мера превенције код инфекција?

- a. Прање руку пре и после сваког контакта са болесником
- б. Све отворене ране асептично превижати
- ц. Антибиотици
- д. Ниједан одговор није тачан

11. Спирометрија је дијагностичка процедура којом се процењује:

- a. Срчана инсуфицијенција
- б. Бубрежна функција
- ц. Плућна функција

12. За интратрускуларну апликацију лека користи се мишићна маса глутеуса и то?
- а. Спољни доњи квадрант глутеуса
 - б. Спољни горњи квадрант глутеуса
 - ц. Унутрашњи доњи квадрант глутеуса
 - д. Унутрашњи горњи квадрант глутеус
13. Интравенски се могу убризгати?
- а. Само уљани раствори лека
 - б. Само водени раствори лека
 - ц. Само суспензије
 - д. Водени раствори и суспензије
14. Који су сигурни знаци кардиореспираторног застоја? (заокружите тачан одговор)
- а. Измењено стање свести
 - б. Сужене зенице
 - ц. Једва мерљив притисак и једва опипљив пулс
 - д. Нагли губитак свести, одсуство дисања, одсуство пулса на каротидама
15. Када је најбоље да се узме брис грла?
- а. Ујутро
 - б. Поподне
 - ц. Увече
 - д. У току кашља
16. У току анафилактичке реакције болесник осећа неколико битних симптома:
- а. Осећај топлоте, зујања у ушима, вртоглавица, трњење руку, ногу, језика, гушење, лупање срца, малаксалост
 - б. Учестало мокрење, учестале столице, главобоља
 - ц. Тремор, знојење дланова, узнемиреност
17. Набрекле вене на врату су знак:
- а. Артеријске хипертензије
 - б. Артеријске хипотензије
 - ц. Плућне хипертензије

18. Лекови у течном облику се најбрже ресорбују апликацијом:

- а. Интракутаних ињекција
- б. Интрамускуларних ињекција
- ц. Супкутаних ињекција

19. Интрахоспиталне инфекције настају у болници после пријема болесника после (заокружите тачан одговор):

- а. 12х
- б. 24х
- ц. 48х

20. Основни витални знаци су (заокружите нетачан одговор):

- а. Температура
- б. Пулс
- ц. Крвни притисак
- д. Дисање
- е. Сатурација крви угљен-диоксидом

21. Провера дисања и пулса код особа без свести треба да траје (заокружите тачан одговор):

- а. 10 сек.
- б. 10 мин.
- ц. 2 мин.
- д. 30 сек.

22. Нормална вредност дијастолног крвног притиска износи:

- а. 40-60 mmHg
- б. 60-80 mmHg
- ц. 100-120 mmHg
- д. 120-140 mmHg

23. По правилу на колико треба мењати интравенску канилу? (заокружите тачан одговор)

- а. На 48- 72 сата – по потреби и раније
- б. На 6 сати
- ц. На 12 сати

25. У циљу профилаксе декубитуса болесник треба да мења положај у постељи:

- а. Сваки други дан
- б. Два пута дневно
- ц. Једном дневно
- д. На свака 2 сата
- е. По препоруци лекара

26. Које крвне судове би требало користи за апликацију лека интравенском канилом?

- а. У самој кубиталној регији
- б. На шаци
- ц. Дисталне вене руке (најбоље на недоминатној страни)

27. Инфузије се дају:

- а. Ентерално
- б. Парентерално
- ц. Пер ос
- д. Епикутано

28. Телесна температура мерена ректално је већа од температуре мерене аксиларно за:

- а. 0 - 0,2° C
- б. 0 - 0,5° C
- ц. 0,5 - 1° C
- д. 2 - 2,5° C